

ساعت شروع: ۸ صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهريور ماه سال ۱۴۰۰ مرکز سنجش و پايش كيفيت آموزشی http://aee.mediu.ir			

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سوالات	نمره
۱	<p>گزاره‌های زیر را با انتخاب واژه مناسب، کامل کنید. (یک واژه اضافه است)</p> <p>بردار جابه‌جا‌یی - برداری - تندی متوسط - بردار مکان - شتاب - نرده‌ای</p> <p>الف) تندی متوسط، کمیتی است.</p> <p>ب) پاره خط جهت‌داری که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می‌کند نامیده می‌شود.</p> <p>پ) شبیب خط مماس بر نمودار سرعت - زمان در هر لحظه برابر در آن لحظه است.</p> <p>ت) برداری که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می‌کند جسم در آن لحظه نامیده می‌شود.</p> <p>ث) در حرکت متوجه بدون تغییر جهت، اندازه سرعت متوسط در هر بازه زمانی برابر در آن بازه زمانی است.</p>	۱/۲۵
۲	<p>خودرویی از حال سکون در امتداد محور x شروع به حرکت می‌کند. پس از 125، سرعت خودرو به 24 m/s در جهت x می‌رسد. بزرگی شتاب متوسط خودرو در این بازه زمانی چقدر است؟</p>	۰/۷۵
۳	<p>شکل روبرو نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که با سرعت ثابت 2 m/s در جهت محور x حرکت می‌کند.</p> <p>الف) مسافت پیموده شده این متحرک در بازه زمانی صفر تا 65، چند متر است؟</p> <p>ب) معادله مکان - زمان این متحرک را بنویسید.</p> <p>پ) t' چند ثانیه است؟</p>	۰/۲۵ ۰/۵ ۰/۷۵
۴	<p>توضیح دهید کدام‌یک از نمودارهای مکان - زمان شکل زیر، می‌تواند نشان دهنده نمودار $x-t$ یک متحرک باشد.</p> <p>(ب)</p> <p>(الف)</p>	۰/۵
۵	<p>الف) اندازه نیروی مقاومت شاره وارد بر جسم در حال حرکت درون شاره به چه عواملی بستگی دارد؟ (۲ مورد)</p> <p>ب) دو عامل مؤثر بر ضریب اصطکاک ایستایی بین دو سطح را بنویسید.</p> <p>پ) همانند شکل روبرو، جسمی را به نخی بسته و از سقف آویزان می‌کنیم. با انتقال شکل به پاسخ‌نامه، نیروهای وارد بر این جسم ساکن رارسم کنید.</p>	۰/۵ ۰/۵ ۰/۵

ادامه سوالات در صفحه دوم

ساعت شروع: ۸ صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهريور ماه سال ۱۴۰۰ http://aee.mediu.ir			

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می‌باشد.


ردیف	سؤالات	نمره
۶	شخصی به وزن $N = 600$ درون آسانسوری، روی یک ترازوی فنری ایستاده است. اگر آسانسور با سرعت ثابت در حال حرکت باشد، ترازو چه عددی را نشان می‌دهد؟ چرا؟	۰/۷۵
۷	همانند شکل زیر، به جسمی به جرم 20 kg وارد می‌شود و جسم با شتاب ثابت 2 m/s^2 روی سطح افقی به طرف راست حرکت می‌کند. الف) آیا نیروهای وارد بر جسم متوازن‌اند؟ ب) اندازه و جهت نیروی اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح را تعیین کنید.	۰/۲۵
۸	در شکل روبرو، نمودار نیروی کشسانی بر حسب تغییر طول فنر برای یک فنر رسم شده است. ثابت فنر (k) چند نیوتون بر سانتی‌متر است؟	۰/۷۵
۹	درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را با واژه‌های ((درست)) یا ((نادرست)) در پاسخ نامه مشخص کنید. الف) دوره تناوب آونگ ساده، به جرم و دامنه آن بستگی دارد. ب) بیشینه تندی نوسانگ در حرکت هماهنگ ساده با بسامد زاویه‌ای به‌طور مستقیم، متناسب است. پ) یکی از ویژگی‌های موج پیش‌رونده، انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر در جهت انتشار موج است. ت) امواج مکانیکی، از رابطه متقابل میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به وجود می‌آیند. ث) در طیف امواج الکترومغناطیسی، بیشترین بسامد مربوط به امواج رادیویی است. ج) اگر یک آونگ با بسامدی برابر با بسامد طبیعی آن به نوسان درآید، برای آونگ، تشدید (رزونانس) رخ می‌دهد. چ) بازتاب یک دسته پرتوی موازی نور از سطح یک کاغذ، از قانون بازتاب عمومی امواج پیروی نمی‌کند.	۱/۷۵
۱۰	الف) پژواک را تعریف کنید. ب) از بین موارد زیر، عامل‌های مؤثر بر تندی صوت را انتخاب کنید و در پاسخ‌نامه بنویسید. ((شکل موج - جنس محیط - دامنه موج - دمای محیط - بسامد موج))	۰/۵ ۰/۵
۱۱	در نمودار جابه‌جایی- مکانی موج عرضی شکل زیر، $\Delta x = 10\text{ cm}$ و $\Delta y = 25\text{ cm}$ است. اگر بسامد نوسان‌های چشمۀ این موج 10 Hz باشد: الف) طول موج چند سانتی‌متر است? ب) دامنه موج چند سانتی‌متر است? پ) دوره تناوب موج چند ثانیه است?	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۵

ادامه سوالات در صفحه سوم

ساعت شروع: ۸ صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهريور ماه سال ۱۴۰۰ مرکز سنجش و پايش كيفيت آموزشي http://aee.medu.ir			

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می‌باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
۱۲	معادله مکان - زمان یک نوسانگر هماهنگ ساده در SI به صورت $x = 40\pi t \cos 10\pi t$ است. بسامد این نوسانگر چند هرتز است؟	۰/۷۵
۱۳	شکل زیر، نمودار تبدیل انرژی در حین حرکت هماهنگ ساده یک سامانه جرم - فنر روی سطح افقی (بدون اصطکاک) را نشان می‌دهد. نام هر یک از انرژی‌های ((الف، ب و پ)) را در پاسخ‌نامه بنویسید. 	۰/۷۵
۱۴	الف) شدت صوت در یک کتابخانه $I_o = 10^{-12} W/m^2$ است. تراز شدت این صوت چند دسیبل است؟ ب) ضریب شکست یک نوع شیشه $\frac{3}{2}$ است. تندی انتشار نور در این محیط چند متر بر ثانیه است؟ ($c = 3 \times 10^8 m/s$)	۰/۷۵
۱۵	توضیح دهید نظریه کوانتمی تابش که توسط اینشتین مطرح شد و در آن نور به صورت مجموعه‌ای از بسته‌های انرژی در نظر گرفته شد چگونه به تبیین اثر فتوالکتریک کمک کرد؟	۰/۷۵
۱۶	کوتاه‌ترین طول موج در رشتۀ براکت ($n' = 4$) هیدروژن اتمی را به دست آورید و تعیین کنید که این طول موج در کدام گستره طول موج‌های الکترومغناطیسی قرار دارد.	۱
۱۷	نام هر یک از واپاشی‌های زیر را در پاسخ‌نامه بنویسید. الف) $^{242}_{94}Pu \rightarrow ^{238}_{92}U + ^{4}_{2}He$ ب) $^{18}_{9}F + e^- \rightarrow ^{18}_{8}O + ^{-1}_{0}e^-$ پ) $^{231}_{90}Th \xrightarrow{\gamma} ^{231}_{90}Th$	۰/۷۵
۱۸	واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید. الف) طیف گسیلی یک لامپ حاوی مقداری گاز کم‌فسار و رقیق که به ولتاژ بالا وصل است، طیفی (پیوسته - خطی) است. ب) خواص شیمیایی هر اتم را تعداد (پروتون‌های - نوترون‌های) هسته تعیین می‌کنند. پ) نیروی الکتروستاتیکی بین دو پروتون درون هسته، (بلندبرد - کوتاه‌برد) است. ت) انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون‌های یک هسته را انرژی (یونش الکترون - بستگی هسته‌ای) می‌نامند. ث) هنگام گذار الکترون از یک حالت مانا با انرژی بیشتر به یک حالت مانا با انرژی کمتر یک فوتون (جذب - تابش) می‌شود.	۱/۲۵
۱۹	نیمه عمر یک نمونه پرتوزا ۴ روز است. پس از گذشت چند روز تعداد هسته‌های پرتوزا این نمونه به $\frac{1}{64}$ تعداد هسته‌های پرتوزا اولیه می‌رسد؟	۱/۲۵
۲۰	شاد و سلامت باشید	

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسرکشور شهریور ماه سال ۱۴۰۰	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۱	الف) نرده‌ای ص. <u>۳</u> ب) بردار جابه‌جایی ص. <u>۲</u> ث) تندی متوسط ص. <u>۴</u>	۱/۲۵	پ) شتاب ص. <u>۱۱</u> هر مورد (۰/۲۵)
۲	ص. <u>۱۱</u>	۰/۷۵	$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ (۰/۲۵) $a_{av} = \frac{۲۴ - ۰}{۱۲ - ۰}$ (۰/۲۵) $a_{av} = ۲ \text{ m/s}^2$ (۰/۲۵)
۳	الف) ۱۲ متر (۰/۲۵)	۱/۵	$x = vt + x_0$ (۰/۲۵) $x = ۲t - ۴$ (۰/۲۵) $v = v_{av} = \frac{x - x_0}{t' - t_0}$ (۰/۲۵) $v = \frac{۰ - (-۴)}{t' - ۰}$ (۰/۲۵) $t' = ۲s$ (۰/۲۵) پ) ص. <u>۱۴</u>
۴	شکل الف (۰/۲۵) زیرا متحرک در هر لحظه از زمان صرفاً در یک مکان می‌تواند باشد. (۰/۲۵) ص. <u>۲۲</u>	۰/۵	
۵	الف) بزرگی جسم (۰/۲۵)، تندی جسم (۰/۲۵) ص. <u>۲۴</u> ب) جنس سطح تماس دو جسم (۰/۲۵) میزان صافی و زبری آنها (۰/۲۵) ص. <u>۴۰</u> پ) رسم درست هر نیرو (۰/۲۵) ص. <u>۵۰</u>	۱/۵	
۶	ص. <u>۵۰</u>	۰/۷۵	$F_N - W = ma$ (۰/۲۵) $F_N - W = ۰ \Rightarrow F_N = W$ (۰/۲۵) $F_N = ۶۰۰ N$ (۰/۲۵)
۷	الف) خیر (۰/۲۵) ص. <u>۲۸</u> ب) به طرف چپ (۰/۲۵) ص. <u>۴۰</u>	۱/۲۵	$F - f_k = ma$ (۰/۲۵) $۵۰ - f_k = ۲۰ \times ۲$ (۰/۲۵) $f_k = ۱۰ N$ (۰/۲۵)
۸	ص. <u>۴۱</u>	۰/۷۵	$F_e = kx$ (۰/۲۵) $۶۰ = k(۳)$ (۰/۲۵) $k = ۲۰ N/cm$ (۰/۲۵)
۹	الف) نادرست ص. <u>۵۹</u> ب) درست ص. <u>۵۹</u>	۱/۷۵	ت) نادرست ص. <u>۶۶</u> پ) درست ص. <u>۶۲</u>
۱۰	چنین بازتابی، پژواک می‌گویند. (۰/۵) ص. <u>۷۸</u>	۱	ج) نادرست ص. <u>۸۱</u> ه) مورد (۰/۲۵) ص. <u>۶۸</u>
	ب) جنس محیط (۰/۲۵)، دمای محیط (۰/۲۵) ص. <u>۷۱</u>		

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: فیزیک ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان: ۱۳/۰۶/۱۴۰۰	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور شهریور ماه سال ۱۴۰۰	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۱۱	(الف) $\lambda = 25\text{cm}$ ۹۰. ص. ۰/۲۵	(ب) $A = 10\text{cm}$ ۰/۲۵	(۰/۲۵)
۱۲	(پ) $w = 2\pi f$ ۵۵. ص. ۰/۲۵	(۰/۲۵)	(۰/۲۵)
۱۳	(الف) انرژی پتانسیل ۷۳. ص. ۰/۲۵	(ب) انرژی کل (انرژی مکانیکی) ۵۸. ص. ۰/۲۵	(۰/۲۵)
۱۴	(الف) $\beta = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ۸۴. ص. ۰/۲۵	(۰/۲۵)	(۰/۲۵)
۱۵	بنابر نظر اینشتین، وقتی نوری تکفام بر سطح فلزی می‌تابد هر فوتون صرفاً با یکی از الکترون‌های فلز برهم‌کنش می‌کند (۰/۲۵) اگر فوتون در حین برهم‌کنش انرژی کافی داشته باشد تا فرایند خارج کردن الکtron از فلز را انجام دهد (۰/۲۵) الکترون به طور آنی از سطح فلز خارج می‌شود. ۹۷. ص. ۰/۲۵		
۱۶	۱۰۱. ص. ۰/۲۵	(الف) $\lambda = 1600\text{nm}$ ۰/۲۵	(۰/۲۵)
۱۷	(الف) بتای مثبت ۱۱۶. ص. ۰/۲۵	(ب) آلفا ۱۱۸. ص. ۰/۲۵	(ب) گاما ۱۱۶. ص. ۰/۲۵
۱۸	(الف) خطی ۹۹. ص. ۰/۲۵	(ب) پروتون‌های ۱۱۳. ص. ۰/۲۵	(پ) بلندبرد ۱۱۴. ص. ۰/۲۵
۱۹	(ت) بستگی هسته‌ای ۱۱۵. ص. ۰/۲۵	(ث) تابش ۱۰۵. ص. ۰/۲۵	(ب) مورد ۱۱۶. ص. ۰/۲۵
۲۰	همکار محترم با تشکر از زحمات شما، لطفاً برای پاسخ‌های صحیح دیگر، نصہ لازم را در نظر بگیرید.		